Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego

LP	NAZWA	NR CAS	wielkośc opakowania	ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU			ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY		ODDZIAŁ W GDAŃSKU		ODDZIAŁ W KATOWICACH		ODDZIAŁ W KRAKOWIE			ODDZIAŁ W KIELCACH	ODDZIAŁ W LUBLINIE				ODDZIAŁ W ŁODZI			ODDZIAŁ W OLSZTYNIE			ODDZIAŁ W OPOLU	ODDZIAŁ W POZANIU					ODDZIAŁ W RZESZOWIE			ODDZIAŁ W SZCZECINIE		ODDZIAŁ W WARSZAWIE			ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU				ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE		LICZBA OPAKOWAŃ
				BIAŁYSTOK	Suwałki	Łomża	BYDGOSZCZ	Włocławek	GDAŃSK	Słupsk	Częstochowa	Bielsko-Biała	KRAKÓW	Tarnów	Nowy Sącz	KIELCE	LUBLIN	Biała Podlaska	Chełm	Zamość	ŁÓDŹ	Sieradz	Piotrków Trybunalski	OLSZTYN	Elbląg	Giżycko	OPOLE	POZNAŃ	Kalisz	Piła	Konin	Leszno	Rzeszów	Jasło	Przemyśl	SZCZECIN	Koszalin	WARSZAWA	Ciechanów	Radom	WROCŁAW	Jelenia Góra	Legnica	Wałbrzych	ZIELONA GÓRA	Gorzów Wlkp.	
				szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	
1	Azotan srebra 0,1 mol/l (0,1N) ciecz, stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C c(AgNO3)=0,1mol/l +/-0,2 %	7761-88-8	ampułka				0	1																								1										1					3
2	Azotan srebra 0,1 mol/l +/-0,2%, roztwór mianowany, odniesienie do wzorca NIST	7761-88-8	op.=1l				0								1																																1
3	Aceton cz.d.a., zawartość C3H6O min. 99,5 %	67-64-1	op.=1l				2																		1										1												4
4	Amonu molibdenian 4 . hydrat , zawartość ≥ 99,0 %	12054-85-2	op.=500g				2										1						1		1		1											1	1						1		9
5	Amonowy siarczan, cz.d.a. zawartość min 98,5 %	7783-20-2	op.=250g	1			0																																								1
6	Antymonylu-potasu winian 3-hydrat cz.d.a., czystość ≥ 99,0 %	28300-74-5	op.=100g				0														1						1																				2
7	Alkohol etylowy 96% cz.d.a.	64-17-5	op.=1 l				0	3								10	2						1										5												4		25
8	Alkohol etylowy skażony (alkoholu tertbutylowego 1%, 2-propanolu 2%, bitrex 0,001%	3734-33-6	op.=5 l				0				4										2							5										1									12
9	Amoniak roztwór 25%, zawartość min. 24 max. 28 %	1336-21-6	op.=1l	1	1		0	1					3										1			1	2			1					1	2	2								1		17
10	4-aminoantypiryna CZDA, zawartość min. 98 %	83-07-8	op.=25g	2			0	1																					1																1		5
11	Azydek sodu cz.d.a., zawartość min. 99 %	26628-22-8	op.=100g				0						1													1																					2
12	Antymonylu-potasu winian 0,5-hydrat cz.d.a., zawartość min. 99 %	331753-56-1	op.=50g				1						1																		1																3
13	Amonu żelaza(II) siarczan 6-wodny cz.d.a., zawartość min. 99,0 max. 101,0 %	7783-85-9	op.=1kg				0																								2																2
14	Bezwodnik octowy 99% (GC) czystości p.a.	108-24-7	op.=1l				0		1								4										1																		1		7
15	Bezwodnik kwasu chromowego cz.d.a, zawartość ≥ 99.0 %	1333-82-0	op.=250g				0	1																																							1
16	b -gliceryno fosforan dwusodowy cz.d.a, zawartość min 98, 0 %	13408-09-8	op.=100g				0																						1																		1
17	Błękit metylenowy czda	61-73-4	op.=10g				1																							1	1														1		4
18	błękit bromotymolowy, Straty po suszeniu max. 1,4%	76-59-5	op.=5g				0																							1									1								2
19	Błękit tymolowy cz.d.a.	76-61-9	op.=10g				0																							1																	1
20	Czerń eriochromowa T, wskaźnik	1787-61-7	op.=5g				0							1															1																		2
21	Czerwień metylowa, wskaźnik	493-52-7	op.=5g				0									1																	1														2
22	Chloramina T, zawartość 99.0 - 103.0 %	7080-50-4	op.=250g				0														1			1										1							1						4
23	Cynku siarczan x 7 H2O, czda, zawartość 99.5÷100.5 %	7446-20-0	op.=500g				0							2										1										1				1		1							6
24	Chlorek kobaltu II 6-wodny cz.d.a., Zawartość 99-101%	7791-13-1	op.=100g				0				1	1						1									1																				4
25	Chlorek amonu, czda,zawartość ≥ 99.5 %	12125-02-9	op.=500g			2	1	1				1		2	2						1			1	1	1	1		1		1		1			2			1	1					1		22
26	Chlorek potasu CZDA, zawartość min. 99,5%	7447-40-7	op.=1kg	1			1							1	1																				1			1		1	1					1		9
27	Chlorek potasu roztwór 3 mol/l	7447-40-7	op.=500ml				0														2																			1							3
28	Czerwień metylowa sól sodowa cz.d.a	845-10-3	op.=5g				0																							1									1								2
29	Celuloza , mikrokrystaliczny proszek rozmiar cząsteczki 20 µm	9004-34-6	op.=50g				0																										1							1							2
30	Chlorek magnezu 6*hydrat CZDA, zawartość min. 99%	7791-18-6	op.=250g				0	1														1																							1		3

31	Chlorek cezu i lantanu roztwór buforowy, według Schinkela do spektroskopii absorpcji atomowej 10 g/l CsCl + 100 g/l La, zawartość lantanu 95.2 - 105.2 g/l, Co, Fe, K, Mg, Ni, Sr ≤ 1.0 mg/l, Cd, Cu, Li, Mn ≤ 0.2 mg/l, Na, Zn ≤ 2.0 mg/l, Ca ≤ 5.0 mg/l)	nie dotyczy	op.=1l				0								1																																	1
32	Chlorek wapnia bezwodny do eksykatorów	10043-52-4	op.=1 kg				0							1														3																				4
33	Chlorek wapnia czda, zawartość ≥ 98.0 %	10043-52-4	op.=500g	1			0														1	1							1				1			1												6
34	Chlorek cezu zawartość ≥ 99.5 %	7647-17-8	op.=25g				0							1						1																												2
35	Chloroform cz.d.a.	67-66-3	op.=1l				0	8																																						6		14
36	6 hydrat chlorku żelaza III cz.d.a., zawartość ≥ 99.0 %	10025-77-1	op.=100g	1			1						1								1			1																							5
37	1,5 - difenylokarbazyd cz.d.a. zawartość ≥ 98,0%	140-22-7	op.=10g				0										1							1		1																					3
38	Dodecylosiarczan sodu,zawartość min. 99,0 %	151-21-3	op.=25g				0																						1																			1
39	Di-sodu szczawian roztwór mianowany 0,05 mol/l z odniesieniem do SRM z NIST	62-76-0	op.=1l				0						1		1														1		1											2	1		1		8
40	Di-sodu szczawian 0,05mol/l = 0,1 N, odważka analityczna, stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C = 0,05 mol/l +/-0,2 %	62-76-0	ampułka	1			2			1		1								1								2					1				1			1		1					12
41	Sodu diwodorofosforan NaH2PO4 x H20	10049-21-5	op.=500g				0	1			1																	1					1															4
42	D-(+)Glukoza, zawartość ≥ 99,5 % (GC)	50-99-7	op.=100g				1																										1						1				1	1			5
43	Dichloroizocyjanuran sodu dihydrat zawartość ≥ 98.0% (AT)	51580-86-0	op.=50g				0								1			1											1					1		1								1		6
44	Di-sodu wersenian (C10H14N2O8Na2 · 2H2O) 0,05 mol/l r-r mianowany	139-33-3	op.=1l				0																											1													1
45	Diwodorofosforan sodu bezwodny cz.d.a., zawartość min. 99,0%	7558-80-7	op.=250g				0																													1											1
46	Dionex AS22 Eluent koncentrat zawierający 0,45 M węglan sodu i 0,14 M wodorowęglan sodu w wodzie dejonizowanej ; o rzeczywistym stężeniu mieszczącym się w zakresie ± 2,5% określonym przez jedną lub więcej sprawdzonych niezawodnych metod analizy, takich jak chromatografia jonowa, spektrofotometria UV (z zastosowaniem NIST lub materiału odniesienia USP, jeśli dotyczy), miareczkowanie (z użyciem materiału referencyjnego NIST) i przygotowanie grawimetryczne	497-19-8 144-55-8	op.=250ml				0								1	2					1	1	1		1		1			1	1											1					11
47	Di-sodu wodorofosforan 7 hydrat cz.d.a., zawartość 99 ÷ 102%	7782-85-6	op.=250g				0						1								2			1								1															5
48	Di-sodu tetraboran 10.hydrat, cz.d.a. min. 99,5%	1303-96-4	op.=500g				0																						1							1											2
49	Disodu wersenian 2-hydrat czda czystość ≥ 99,0%	6381-92-6	op.=500g		1		0																																								1
50	Di-sodu wersenian 0,01mol/L - roztwór mianowany	139-33-3	op.=1l				0			1																																					1
51	Di-sodu wersenian odważka analityczna 0,05mol/l Titra Fix, stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C = 0,05 mol/l +/-0,2 %	139-33-3	ampułka		1		0																					2									1			1							5
52	Di-sodu wersenian 0,01 mol/l - odważka analityczna, stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C = 0,01 mol/l +/-0,2 %	139-33-3	ampułka				0			2			2																																		4
53	Diwodorofosforan amonu cz.d.a	7722-76-1	op.=50g				0							1																																	1
54	Dwuwodorocytrynian potasu zawartość ≥ 98,0% (NT)	866-83-1	op.=1kg	1			0																																								1
55	Di-sodu wodorofosforan 12.hydrat cz.d.a., zawartość 99 ÷ 102%	10039-32-4	op.= 250g			1	0																					2																			3
56	Eter naftowy CZDA	8032-32-4	op.=1l				0				5				6								2					2						2												2		18
57	Etanoloamina, cz.d.a., zawartość min 99%	141-43-5	op.=250ml				0	1																																							1
58	Di-sodu wersenian EDTA (sól dwusodowa) 0,01 M, roztwór ze swiadectwem z odniesieniem do NIST z akredytowanego laboratorium	139-33-3	op.=5l				0							1																																	1

59	Fenoloftaleina 1% zawartość 1,0%a ± 0,1%;	77-09-8	op.=250ml		1		0																								1		1												1		4
60	Fenoloftaleina, biały lub jasnożółty drobnokrystaliczny proszek	77-09-8	op.=5g	1			0																																	1								2
61	Aktywowany krzemian magnezu, wielkość ziaren 0.150-0.250 mm, pH 9.5 (100 g/l, H_2O, 20 °C), analiza sitowa (przesiewanie na sucho;> 0,15 mm)≥ 80 %	1343-88-0	op.=100g				0																															5	2					1			7
62	Formaldehyd 36-38%	50-00-0	op.=250ml				0							1	2																																3
63	Ferroiny siarczan 1/40M, wskaźnik	14634-91-4	op.=50ml				2	1									1										1			1																6
64	Fenyloalanina cz.d.a	63-91-2	op=25g				0																																								0
65	Fenol cz.d.a., zawartość 99.0-100.5%	108-95-2	op.=100g	1			0																											1													2
66	Glicyna, zawartość min 98,5%	56-40-6	op.=100g	1			0																																								1
67	Gliceryna bezwodna czda, zawartość 99,5 - 100%	56-81-5	op.=100ml				0															1																									1
68	Glinu siarczan 18.hydrat, cz.d.a., zawartość 99,0 - 106,0 %	7784-31-8	op.=100g				0								2												2																			4
69	Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a., zawartość min. 99,0 %	5470-11-1	op.=250g				0	1			1																	1			1													1		5
70	Jod krystaliczny cz. d. a., zawartość min. 99.8 %	7553-56-2	op.=50g				0																									1							1							2
71	Jod (do1000 ml, $c(I_2)$ = 0.05 mol/l (0.1 N))	7553-56-2	ampułka				0																																			1				1
72	Jodan potasu cz.d.a., zawartość 99.7 - 100.4 %	7758-05-6	op.=100g				0																																			1				1
73	Kwas cytrynowy monohydrat cz.d.a., zawartość 99.5 - 100.5 %	5949-29-1	op.=1kg				0														2	2	5	1														1								11
74	Kwas solny 1 mol/ dm^3 (1 N)	7647-01-0	op.= 250ml	2			0																								2																4
75	Kwas solny 2 mol/l , stężenie substancji 1.990 - 2.010. Niepewność pomiaru +/- 0,006	7647-01-0	op.=1l		1		0														2																									3
76	Kwas szczawiowy 2 - hydrat cz.d.a., zawartość min. 99.5 %	6153-56-6	op.=250g				0															1					2				1															4
77	Kwas mrówkowy do chromatografii cieczowej ze spektrometrem masowym. Stosowany jako dodatek do eluentu do LC-MS (przydatność zgodna z LCMS). Czystość minimalna 75%, współczynnik załamania światła (n20/D) 1,37-1,372. zawartość substancji nielotnych nie powinna przekraczać 0,002%, max. zawartość potasu nie powinna przekraczać 0,1 ppm i sodu 0,5 ppm	64-18-6	op.=50ml	2	1		0										2				1			1	1	2																				10
78	Kwas solny 3 mol/ dm^3 (3 N)	7647-01-0	op.= 250ml																								1																			1
79	Kwas solny 0,02 mol/l (0,02N)odważka analityczna	7647-01-0	ampułka				3		4	2					1												1											5	1							17
80	Kwas solny 0,02 M, roztwór ze swiadectwem z odniesieniem do NIST z akredytowanego laboratorium	7647-01-0	op. = 1 l				0					1		1									1								1													1		5
81	Kwas szczawiowy 0,05 mol/l	6153-56-6	ampułka				0														1	1																									2
82	Kwas solny 0,1 M, roztwór ze swiadectwem z odniesieniem do NIST z akredytowanego laboratorium	7647-01-0	op. = 1 l				2				5			1	1								1		1						1							1								13
83	Kwas solny, 0,01 mol/l, odważka analityczna	7647-01-0	ampułka				0														2																										2
84	kwas octowy 80 %	64-19-7	op.=1l	2			0																				1																		2		5
85	Kwas borowy, zawartość ≥ 99,5 %	10043-35-3	op.=500g	1		1	2								1		5				1	1																2			1					15
86	Węglan sodu - koncentrat o stężeniu 0,1 mol/l w wodzie	497-19-8	op.=1l																												2			1	1	1										5
87	Kwas askorbinowy, cz.d.a., zawartość ≥ 99.0 %	50-81-7	op.=250g				4			2				1	1	1					2	2					2				2	1	1	1		1					1	1	3	3	1			30
88	Kwas 4-pirydynokarboksylowy, zawartość ≥ 98.0 %	55-22-1	op.=250g				0		1												1			1																		1					4
89	Kwas chromotropowy, do analiz, zawartość ≥ 98.5 %	5808-22-0	op.=25g				0							1																	1																2
90	Kwas solny 37 %, czda	7647-01-0	op.=1l	2			3	2						4	1					1							2				2								2								19
91	Kwas ortofosforowy (V) 85%, CZDA ODCZ. FP	7664-38-2	op.=1l	2			1						1									1		2	1	1	2		1	2						2	1				2					19

92	Kwas siarkowy (VI) 0,05mol/l +/-0,2% r-r mianowany	7664-93-9	op.=1l				0																																6									6
93	Kwas azotowy 65% cz.d.a.	7697-37-2	op.=1l				0								2		4														2	1	1					3							1		14
94	Kwas ortofosforowy 10% czda	7664-38-2	op.=1l				0														1																										1
95	Kwas 1.3-dimetylobarbiturowy ≥ 99.0% (T)	769-42-6	op.=250g				0		1					1							1			1										1				1			1						7
96	Kjeltabs 1,5g K2SO4/ 7,5 mg Se, Katalizator do analizy azotu Kjeldahla, tabletki o masie 1,5g o zawartości selenu 7.5 mg	nie dotyczy	op.=1000szt				0																																	1								1
97	Kjeltabs CuSO4/K2SO4 3,5g, Katalizator do analizy azotu Kjeldahla, tabletki o masie 3,5g o zawartości pięciowodnego siarczanu miedzi równej 0,4g	nie dotyczy	op.=1000szt			1	0		1	1		1						1																									1				6
98	Kwas metanosulfonowy zazwartość min. 99%	75-75-2	op.=250ml				0														1																										1
99	Kwas maleinowy cz.d.a. , zawartość (w przeliczeniu na substancję bezwodną) min. 99,0 max. 101,0 %	110-16-7	op.=500g				0									1																							1								2
100	Kwas solny 1 mol/l (1N) - odważka analityczna, stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C = 1 mol/l +/-0,2 %	7647-01-0	ampułka	5			0								2																										2						9
101	Kwas siarkowy 0,5 mol/l (1N) - odważka analityczna, stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C = 0,5 mol/l +/-0,2 %	7664-93-9	ampułka				0																						1																		1
102	Kwas siarkowy 0.05 mol/l (0.1 N), odważka analityczna, stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C = 0,05 mol/l +/-0,2 %	7664-93-9	ampułka				0																										1														1
103	kwas octowy do LC/MS, zawartość ≥ 99,8%	64-19-7	op.= 50ml				0										1																														1
104	Kwas humusowy, sól sodowa, techn., zawartość 45-70%	68131-04-4	op.=100 g				0							1										1																							2
105	Kolumienki spe Na2SO4 2000x 2000mg	nie dotyczy	op. = 20 szt				0																																1								1
106	Line-Antybakteria 96 - alkohol etylowy 96% (udział wag. 95%) z dodatkiem 2-propanolu (udział wag. 1,0%), 1-propanolu (udział wag. 1,0%), eteru dietylowego (udział wag. 3,0%), preparat dopuszczony ma być do stosowania w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym jako środek bakterio- oraz grzybobójczy	nie dotyczy	op.=4kg	1		4	0															2											8			8	8			2							23
107	L-Kwas glutaminowy czystość ≥ 99,5 % (NT)	56-86-0	op.=100g				0																										1						1				1				3
108	Lantanu (III) chlorek heptahydrat cz.d.a. zawartośc ≥ 98 %	10025-84-0	op.=100g				0																	1																							1
109	Mrówczan amonu , zawartość ≥99.0% , ≤2% wody, Al., Cd, Ba, Bi, Co, Cr Cu, Fe, Mg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sr,Zn ≤5 mg/kg	540-69-2	op.=250g				0		1								1																														2
110	Magnezu disodu wersenian 1 hydrat cz.d.a., zawartość (w preparacie wysuszonym) ~99,0%	14402-88-1	op.=250g				0						1														1							1					1								4
111	Naphrax żywica syntetyczna, o współczynniku załamania 1,73;	nie dotyczy	op.=15ml	1		1	0		1		1					3	2					1																		1	1							12
112	Potasu nadsiarczan cz.d.a., zawartość min. 98%	7727-21-1	op.=250g	1			2						1								1				2	4	1			1				1				2	1							17
113	Nadmanganian potasu 0,01 M	7722-64-7	op.=1l	1			0																																								1
114	N-Alilotiomocznik, zawartość > 98%	109-57-9	op.=50g	1			0						1	1													1													1		1					6
115	N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride,zawartość ≥ 98 %	1465-25-4	op.=5g	1			1						2		1	1	1				1	1	1			1		1						1								1					14
116	Chlorek sodu czda, zawartość min. 99, 5 %	7647-14-5	op.=1kg				0			1						1								1																			1				4
117	Chlorek sodu 0,1 mol/l +/-0,2 %, odważka analityczna	7647-14-5	ampułka				0															2																									2
118	Nadsiarczan sodu cz.d.a., czysty reagent analityczny	7775-27-1	op.=500g				0																							1																	1

119	Octan sodu bezwodny cz.d.a., zawartość min. 99,0 %	127-09-3	op.=500g				0																				1						1													2
120	Olejek immersyjny	nie dotyczy	op.=20ml	1			0																																	1							2
121	Odczynnik Nesslera, do oznaczania soli amonowych, gęstość 1.16 g/cm3 (20 °C), wodorotlenek potasowy(>=10% -<20%), tetrajodortecian potasowy(>=1% -<2%	nie dotyczy	op.=500ml		2		0										1																	1												4
122	Potasu nadmanganian roztwór mianowany 0,02 mol/l (0,1N) z odniesieniem do SRM z NIST	7722-64-7	op.=1l				0							1																										2	1		2		6
123	Potasu nadmanganian 0,02 mol/l + 0,02 %, odważka analityczna	7722-64-7	ampułka			2	1					1									2	1				1				1		1		2						1		3					16
124	Płyn Lugola -wodny roztwór czystego jodu w jodku potasu	12298-68-9	op.=100ml				0								2	2	1					3																	1							9
125	Potasu jodek cz.d.a. zawartość min.99,5%	7681-11-0	op.=50g				1																										1									1					3
126	Potasu dwuchromian, cz.d.a, zawartość min 99,5 %	7778-50-9	op.=100g				0				1																1																				2
127	Paski wskaźnikowe pH 0-14	nie dotyczy	op.=100szt		1	3	0								2						2						11			10					5							1	1			36
128	Potasu diwodorofosforan cz.d.a., zawartość min. 99,0 %	7778-77-0	op.=100g				1								1		1							1			1						1	1		1									1		9
129	Potasu jodek cz.d.a	7681-11-0	op.=500g		2		0						1				2							1		1													1				1			9
130	Potasu chromian,cz.d.a., zawartość min 99%	7789-00-6	op.=250g				0										1					1																								2
131	Paski wskaźnikowe pH 1 – 10 (plastykowy pasek z polem reagującym na odczyn skala 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)	nie dotyczy	op.=100szt				0								1												1														2					4
132	Potasu dwuchromian cz.d.a., zawartość min. 99%	7778-50-9	op.=1kg				1																																								1
133	Potasu jodan Plus NIST standard, odważka analityczna 1/60 mol/l	7758-05-6	ampułka				1										1							1		1																				4
134	Podchloryn sodu 15%	nie dotyczy	op.=1l	1			0																			1	1																		2		5
135	Potasu heksachloroplatynian cz.d.a., zawartość min 39,7% platyny	16921-30-5	op.=5 g				0																				1																				1
136	Wodoru nadtlenek31%	7722-84-1	op.=1l				0					2			10												3	2	5		6						1							2		31
137	Rtęci siarczan cz.d.a. zawartość min 98, 0 %	7783-35-9	op.=50g				3	4																			2																			9
138	Kwas salicylowy cz.d.a. zawartość min 99,0 %	69-72-7	op.=100g	1			0					1			1						1													1												5
139	Sól dwusodowo-magnezowa EDTA, zawartość min. 98 %	29932-54-5	op.=100g				0																				1																				1
140	Sodu octan 3 - hydrat CZDA, czda, zawartość min. 99 %	6131-90-4	op.=1kg				0																				1																				1
141	sulfanilamid, zawartość ≥ 99 %	63-74-1	op.=100g	1	1		2				1		2			1										2							1	1									1				13
142	Sodu molibdenian 2- hydrat cz.d.a., zawartość min. 99,5 %	10102-40-6	op.=1000g				0																			1																					1
143	Sodu tiosiarczan 5-hydrat czda, zawartość 99.5÷100.5 %	10102-17-7	op.=250g				0				1						3				2																										6
144	Siarczan sodu, bezwodny, granulowany, zawartość ≥ 99,0% , postać jak drobna sól kuchenna	7757-82-6	op.=1kg		1		3	2	30	4	10	40	10	10	2	70					18	1	10				35	10	8	2	2			10				10	3	13			1	1	21		206
145	Stearynian stearylowy, zawartość ≥98.0% (GC)	2778-96-3	op.=1g				0	1																																			1			2
146	Sorbent oktadecylowy C18 do napełniania kolumienek do SPE (średnica ziarna 40µm)	nie dotyczy	op.=100g				0																																							0
147	Sodu tiosiarczan c=0,1 mol/l ±0,2% odważka analityczna (ciecz), stężenie odważki analitycznej wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST	7772-98-7	ampułka		3		0										1							1	1	1																				7
148	Siarczan magnezu 7-wodny czystości cz.d.a, zawartość ≥ 99.0 %	10034-99-8	op.=1kg				0	1	1																		1						1	1								1				6
149	Srebra siarczan cz.d.a. zawartość min 99,5 %	10294-26-5	op.=50g				0	1			2																																			3
150	Sodu salicylan, zawartość ≥ 99,5 %	54-21-7	op.=500g	1	1	1	2		1	1			1					1		1		1	1	1	2		2		1	1			1	1	1		3				2		1		4		32
151	Di-sodu szczawian, cz.d.a , zawartość min 99,5 %	62-76-0	op.=60g			1	0										1										1															1					4
152	Siarczan magnezu bezwodny czystości p.a., zawartość min. 98,5%	7487-88-9	op.=1kg				0		1																																						1

153	Sodowy siarczyn bezwodny cz.d.a., zawartość min. 96,0 %	7757-83-7	op.=250g				0	1										1			1	1		1			1								1												7
154	Skrobia czda	9005-84-9	op.=25g		1		0				1													1																			1				4
155	Srebra siarczanroztwór 10g/l w H2SO4	nie dotyczy	op.=2,5l				0				1																																				1
156	Siarczan manganu II bezwodny cz.d.a., zawartość min 99%	7785-87-7	op.=250g		5		0																	1		2																					6
157	Sodu fluorek cz.d.a, zawartość min. 99%	7681-49-4	op.=250g				0																				1																				1
158	Siarczan miedzi x 5 H2O, cz.d.a	7758-98-7	op= 1kg				1																									1															2
159	Siarczan potasu bezwodny cz.d.a. K2SO4 174,27 g/mol	7778-80-5	op.=1kg				0																					2																1		3
160	Azotan srebra, cz.d.a. min 99,9%	7761-88-8	op.=100g				0																				1																				1
161	Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1N) - odważka analityczna	1310-73-2	ampułka				0							1														1																			2
162	Sodu siarczyn 7 hydrat, cz.d.a., zawartość min. 95%	10102-15-5	op.=100g				0																													1										1
163	Sodu wodorotlenek 0,5 mol/l, odważka analityczna	nie dotyczy	ampułka				0														1																										1
164	Sześciocyjanożelazian potasu cz.d.a	13943-58-3	op= 1kg	1			0																																								1
165	Di-sodu szczawian 0,005 mol/l, roztwór ze świadectwem z odniesieniem do NIST z akredytowanego laboratorium	62-76-0	op. = 1 l				0						1																									2	1		2					6
166	Czynniki TRIZMA (do ekstrakcji HBCDD 2 próbki i "zerówka")		op.=250g				0		1								1																														2
167	Trietanoloamina czda, zawartość min. 99%	102-71-6	op.=100ml				0						1	1												1																	1				4
168	Tiocyjanian potasu cz.d.a., zawartość ≥ 99.0 %	333-20-0	op.=250g				0														1													1												2
169	Sodu tiosiarczan 0,01 mol/l z odniesieniem do SRM z NIST	7772-98-7	op.=1l				0					1																																		1
170	Tetraetyloboran sodu, zawartość min. 97% opakowanie 1g	15523-24-7	op.=1g				0																				1																		10		10
171	Tlenek magnezu, czystość ≥ 97,0 %	1309-48-4	op.=250g				0																																			1				1
172	Tri-sodu cytrynian 2 x hydrat, czda, zawartość min. 99 %	6132-04-3	op.=500g				3		1				1		1			1		1			1	2	2	2	2			1		2		1		1								4		26
173	Tabletki selenowe Kjeltabs 5g K2SO4 + 5 mg Se, czystość ≥ 99,99 %,	7782-49-2	op=1000szt				0																									1														1
174	Tabletki selenowe Kjeldahla 3,5g K2SO4 + 3,5 mg Se, czystość ≥ 99,99 %,	nie dotyczy	op.=1000szt				1				1					2																														4
175	Tlenek glinu do oznaczania węglowodorów, wielkość cząstek 0,05-0,15 mm	1344-28-1	op.=100g				0		2																																						2
176	Tabletki Kjeldahla KS 5,0 g -mieszanina katalizująca zawierająca 1000 ± 20 g siarczanu potasu i 10 ± 0,2 g - Tabletki Kjeldahla KS 5,0 g spełniające wymaganie normy PN-EN 25663:2001 (potasu siarczan: selen 100 :1)	nie dotyczy	op.=500szt				0																												1												1
177	Tlenek lantanu (III)cz.d.a , zawartość ≥ 99.5 %	1312-81-8	op.=100g				0	1																																							1
178	Wapnia węglan cz.d.a., zawartość min. 99,0%	471-34-1	op.=100g				0																								1																1
179	Wodoroweglan sodu koncentrat 0,1mol/l w wodzie	144-55-8	op.=1l				0																										1														1
180	Wodorowęglan sodu cz.d.a., zawartość 99.5÷101 %	144-55-8	op.=250g				0																	1				1					1														3
181	Węglan potasowy bezwodny, czda, zawartość min. 99%	584-08-7	op.=500g				0	1	2				1				1				1													1	1									6			14
182	Wodoru nadtlenek 30% cz.d.a.	7722-84-1	op.=1l			3	0										3										1	2				1	1				10			1	10						32
183	Węglan sodu fiksanal 0,05mol/l z odniesieniem do NIST	497-19-8	ampułka				0																									1															1
184	Wskaźnik Tashiro, Gęstość (20ºC) ok. 0,81 g/cm³, Zmiana barwy w zakresie pH:- czerwonofioletowa min. 4,4 - zielona min. 5,8 Wygląd zewnętrzny: ciemnozielona, klarowna ciecz	nie dotyczy	op.=100ml				0														1											1												1			3
185	Sodu wodorotlenek (roztwór) 40%, czda	1310-73-2	op.=20l				0		2	1								1					2										1		1												8
186	Sodu wodorotlenek , czda, zawartość ≥ 98,8 %	1310-73-2	op.=1kg	10	5	10	12	2	3	3	10	1		1	15	30	30	5		3	10			6			5	11	7	2	20	1			2			10	9	14	15	2	7	8	30		197
187	Węglan sodu bezwodny cz.d.a., zawartość ≥ 99.9 %	497-19-8	op.=500g				1								1													1					1														4
188	Winian potasowo-sodowy, tetrahydrat, cz..d.a. zawartość ≥ 99,0 %	6381-59-5	op.=1kg				0	5				1			1	1	1	1														1					1	1			1	1					15
189	Di-potasu wodorofosforan do analizy ≥ 98%	7758-11-4	op.=100g				0	1					1		2						2	1	1	1										1											1		11
190	Wodorosiarczan (VI) sodu, bezwodny ≥ 90,0 %	7681-38-1	op.=250 g				0				1																																				1
191	Wodorotlenek potasu cz.d.a., zawartość min. 85 %	1310-58-3	op.=1kg	1			0																			2												1					1		2		7

192	Winian antymonu i potasu półwodny [K(SbO)C4H4O6*1/2H2O], zawartość min 99 % (100g)	28300-74-5	op.=100g				0																	1			1											1				1				4
193	Wodorofosforan dwupotasowy 3 hydrat (K2HPO4 * 3 H2O) cz.d.a., zawartość ≥ 99.0 %	16788-57-1	op.=250g				0								1																				1								1				3
194	Zieleń bromokrezolowa	76-60-8	op.=5g				0									1																	1														2
195	Zestaw probówkowy -ChZT 150 (3-150mg/l) do fotometrycznego oznaczania odbarwienia dwuchromianu po utlenianiu mieszaniny: dwuchromian potasu / kwas siarkowy / siarczan srebra. Probówki mają pasować do fotometru NANOCOLOR firmy Macherey-Nagel , możliwy pomiar okrągłych szklanych probówek i sprawdzenie współczynnika dla każdego typu przyrządu poprzez pomiar roztworu wzorcowego o znanym stężeniu (współczynnik 0220.))	nie dotyczy	op.=20szt				0					4																1																				4
196	Zawiesina filtracyjna Celite Hyflo Super-cel , przepuszczalność 0,73-1,60 Darcy, gęstość na mokro 263-346 g / l, Rozmiar cząstek: +150 mesh ≤ 12,0%)	68855-54-9	op.=500g				0														1																										1
197	Żel krzemionkowy 0.063-0.2 mm (70-230 mesh) do kolumn chromatograficznych	7631-86-9	op.=1kg				0										1																														1
198	Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci gran. 3-7mm, bez kobaltu (pomarańczowy)	nie dotyczy	op.=1kg				0										2									5																				7